

Glasgow Coma Scale (GCS)

Cette échelle est validée chez les patients comateux ou au début de leur phase d'éveil.

Elle est discutable dans des états pauci relationnels ou végétatifs très prolongés.

Une cotation est attribuée à la meilleure des réponses. La somme de ces cotations définit un score qui varie de 3 à 15 : E + V + M. Le coma est défini pour un score égal ou inférieur à 7.

| E | |
|--|---|
| Ouverture des yeux | |
| Spontanée (ouverture spontanée) | 4 |
| Au bruit (à la parole) | 3 |
| À la douleur (provoquée par un stimulus nociceptif) | 2 |
| Absente | 1 |
| V | |
| Réponse verbale | |
| Orientée (conscient : sait qui il est, où il est et pourquoi) | 5 |
| Confuse (conversation possible mais signes de confusion et de désorientation) | 4 |
| Inappropriée (mots compréhensibles mais conversation impossible) | 3 |
| Incompréhensible (mots incompréhensibles, gémissements, grognements) | 2 |
| Absente | 1 |
| M | |
| Réponse motrice | |
| Obéit (obéit à l'ordre oral) | 6 |
| Adaptée (le mouvement de flexion du membre supérieur localise le stimulus douloureux et le fait disparaître) | 5 |
| Orientée (le mouvement de flexion du membre supérieur se dirige seulement vers le stimulus douloureux) | 4 |
| Flexion réflexe (réponse stéréotypée en triple flexion du membre supérieur) | 3 |
| Extension réflexe (réponse stéréotypée en rotation interne et hyper-extension du membre supérieur) | 2 |
| Absente | 1 |

