

Nom :	Étiquettes du patient
Prénom :	
Date de naissance :	
Service :	
Hôpital/Centre MPR :	
Examineur :	
Date du jour :	

Traumatisme Crânien. Accident Vasculaire Cérébral (AVC) : bilan des déficiences

Évaluation kinésithérapique des performances posturales = Postural Assessment Structural Scale (PASS)

Le PASS est validé et adapté à une utilisation préférentielle sur le plateau technique. Il nécessite une table de rééducation ou d'examen. Sont évalués à la fois le maintien et le changement de postures, en position allongée, assise et debout. Il est particulièrement adapté à l'examen du patient hémiparétique dans les premiers mois qui suivent la cérébro-lésion, y compris les plus atteints (contrairement à la plupart des autres scores validés).

Mobilité

Couché sur le dos	
Se tourne sur le coté hémi	<input type="checkbox"/>
Se tourne sur le côté sain	<input type="checkbox"/>
S'assoit sur le plan de Bobath	<input type="checkbox"/>
Assis sur le plan de Bobath	
Se couche sur le dos	<input type="checkbox"/>
Se lève	<input type="checkbox"/>
Debout	
S'assoit	<input type="checkbox"/>
Peut ramasser un objet à terre	<input type="checkbox"/>
Total sur 21	<input type="text"/>

Équilibre

Assis sans support	<input type="checkbox"/>
Debout avec support	<input type="checkbox"/>
Debout sans support	<input type="checkbox"/>
Appui monopodal coté hémi	<input type="checkbox"/>
Appui monopodal côté sain	<input type="checkbox"/>
Total sur 15	<input type="text"/>
Total PASS sur 36	<input type="text"/>



Guide de cotation

1 Mobilité

0 : ne peut pas.

1 : peut avec aide importante.

2 : aide modérée.

3 : sans aide.

2 Équilibre

■ Assis

0 : impossible.

1 : nécessite un support modéré.

2 : tient assis plus de 10 secondes sans support.

3 : tient assis plus de 5 minutes sans support.

■ Debout avec support

0 : impossible.

1 : nécessite deux personnes.

2 : aide modérée d'une personne.

3 : ne nécessite que l'aide d'une main.

■ Debout sans support

0 : impossible.

1 : peut rester debout au moins dix secondes sans support
(éventuellement de façon très asymétrique).

2 : peut rester debout au moins 1 minute sans support.

3 : idem 2, peut en plus faire des mouvements amples du(des) membre(s) supérieur(s).

■ Appui monopodal

0 : impossible.

1 : quelques secondes seulement.

2 : plus de cinq secondes.

3 : plus de 10 secondes.

